



Centro Veterinario Equino

Manual de Instrucciones del Potrillo

EGUISOF S.L.

Centro Veterinario Equino

Finca Can Jané

Ctra. Valldoriolf km 2,5

08430 La Roca del Vallés

Barcelona

Sofia Freitas 670242687

Guillermo González 659441109

Fax: 935940171

E-mail: eguisof@yahoo.com



Preparación para el Gran Día

¿Cuándo ocurre el parto?

- La gestación de una yegua es de 335 días (320-365).
- La mayoría de las yeguas pare de noche y muchas tienen la capacidad de retrasar el parto para un momento en que se sientan seguras (muchas veces cuando su propietario se va y se quedan solas!!).

Signos de que el parto está cerca:

- La yegua llena la ubre (2-4 semanas antes).
- Pezones distendidos (1-4 días antes).
- Flaccidez de los músculos de la grupa.
- Relajamiento vulvar.

¿Qué puede hacer usted?

- El local para parir debe ser amplio y limpio, con cama alta.
- Romper el saco amniótico **si** el potro tiene esa dificultad.
- Permitir que la madre y el potrito descansen.


La Regla 1, 2, 3:

El potro se debe levantar en **1** hora, mamar hasta **2** horas post parto y la madre debe expulsar la placenta entera durante las primeras **3** horas.

Además verificar que la madre no rechaza el potro y que este expulsa las primeras heces en las primeras 12 horas de vida.

Observar y llamar al veterinario siempre que:

- Yegua en fase de contracciones con saco rojo colgando que no se rompe.
- Rompe aguas hace más de 10 minutos y usted no visualiza el potro, o se visualiza pero han pasado ya 30 minutos sin que la madre consiga expulsarlo.
- El cordón no se ha roto
- La yegua permanece con la placenta colgando más de una hora, o no está entera.
- El potro no se levanta, no mama, o tiene diarrea.
- El ombligo está abultado con secreción y/o sangre o orina por el.



Comportamiento normal del Potrillo

- El neonato sano es un animal vigoroso, curioso y que busca la protección de su madre.
- En los primeros días de vida el potro mama aproximadamente cada 30 minutos, frecuencia que disminuye a medida que pasan los meses.
- El potro neonato pasa muchas horas tumbado.
- En las primeras semanas de vida es común encontrar el potro comiendo las heces de su madre. Este es un comportamiento normal, llamado coprofagia, que es importante para el establecimiento de una flora bacteriana normal en el intestino, y que por lo tanto no debe ser desalentado.
- Coincidiendo con el celo de su madre puede que presente diarrea, No hay motivo de alarma siempre y cuando su actitud sea normal y no perdure.
- Es probable que un día encuentre a su potro probando del forraje e pienso de su madre. Aunque este suele ser un comportamiento normal, en que el potro empieza a copiar a su madre, el pienso para adultos no es adecuado para potros. Se debe entonces colocar pequeñas cantidades de pienso para potros en comedero de potro y elevar el de la madre para que este no lo alcance.

Cuidados con el Potrillo

- El potro requiere **dieta equilibrada y ejercicio**. El crecimiento demasiado rápido asociado a dietas erróneas conlleva a problemas tendinosos (deformidades flexurales y angulares) y/o articulares (OCD)
- **Desparasitar** cada mes hasta destete
- **Vacunar** a partir de los 1-3 meses dependiendo si su madre estaba vacunada y si ha absorbido las defensas de su madre por el calostro
- **Destetar** aproximadamente a los 6 meses de edad
- Cuidar los cascos
- Iniciar manejo.

!! Importante a considerar:

-
-
- Todas las condiciones que le imposibiliten mamar, o que lo deshidraten, lo deprimen y requiere ayuda.
-
- El potro que no mama el calostro, no recibirá las defensas que le darán inmunidad para prevenir enfermedades durante los primeros 3 meses de vida.
-
- **El neonato que presente problemas requiere cuidados intensivos 24 horas.** Deberá ser hospitalizado y el **pronóstico siempre es reservado** por las innumerables complicaciones que pueden surgir, siendo imposible asegurarle que el fuerte gasto económico que supone para salvarlo no será en vano.
-
- La decisión será suya.

