



Centro Veterinario Equino

Felicitaciones!!!

Hoy, ... de de 20... se ha realizado una Ecografía a su yegua que determina que esta gestante de aproximadamente días.

La fecha esperada de parto es (+/- 15 días) de.....de



EGUISOF S.L.
Centro Veterinario Equino
Finca Can Jané
Ctra. Valldoriolf km 2,5
08430 La Roca del Vallés
Barcelona

Sofia Freitas 670242687
Guillermo González 659441109
Fax: 935940171
E-mail: eguisof@yahoo.com

Su futuro potro:



Se deben realizar ecografías en diferentes momentos de la gestación debido a la probabilidad de gestación gemelar y de reabsorción embrionaria hasta los 3 primeros meses. Los controles ecograficos que aconsejamos son:

- 1º- entre 15 y 17 días- para confirmar gestación y detectar gemelos.
- 2º- a los 45 días para descartar reabsorción embrionaria.
- 3º- ecografía o palpación rectal a los 5 meses para detectar perdidas de gestación posteriores a los 45 días e aprovechar el celo siguiente.

! La ecografía y/o palpación en gestación avanzada no descartan gestación gemelar.


Cuidados a tener con la yegua gestante:

- Bueno manejo, alojamiento y alimentación adecuada son la mayor ayuda para que su yegua sobrepase los críticos primeros 90 días de gestación y para que el potro se forme convenientemente durante toda la gestación.
- El ejercicio debe ser suave y sólo ser transportada en caso necesario.
- Mantener un programa adecuado de vacunaciones y desparasitaciones ayuda a proteger el potro.

Tétanos	Antes de la cubrición	-	-	-	10º mes
Influenza		5º mes	7º mes	9ºmes	
Rinopneumonitis		-	-	-	-

Consulte siempre a su veterinario cuando:

- Antes de medicar a una yegua gestante
- Si observa alguna descarga vaginal
- Si encuentra restos de placenta o feto
- Si la yegua sobrepasa los 350 días de gestación.



Signos de que el parto esta cerca:

- La yegua llena la ubre (2-4 semanas antes).
- Pezones distendidos (1-4 días antes).
- Flaccidez de los músculos de la grupa.

Cuando ocurre el parto?¿

- La gestación de una yegua es de 335 días (320-365).
- La mayoría de las yeguas pare de noche y muchas tienen la capacidad de retrasar el parto para un momento en que se sientan seguras (muchas veces cuando su propietario se va y se quedan solitas!!).

Qué puede hacer usted?

- El local para parir debe ser amplio, limpio y con buena cama.
- Romper el saco amniótico se el potro tiene esa dificultad.
- Permitir que la madre y el potrito descansen.

Observar que:

- La madre expulsa la placenta entera y no rechaza el potro.
- El potro se levanta en 30 minutos, mama hasta 3 horas post parto y expulsa las primeras heces en las primeras 12 horas de vida.

Observar y llamar al veterinario siempre que:

- Yegua en fase de contracciones con saco rojo colgando que no se rompe.
- Rompe aguas hace más de 10 minutos y usted no visualiza el potro, o se visualiza pero han pasado ya 30 minutos sin que la madre consiga expulsarlo.
- El cordón no se ha roto.
- La yegua permanece con la placenta colgando más de una hora, o no está entera.
- El potro no se levanta, no mama, o tiene diarrea.

! Importante a considerar:

El neonato que presente problemas requiere cuidados intensivos 24 horas. Deberá ser hospitalizado y el pronóstico siempre es reservado por las innumerables complicaciones que pueden surgir, siendo imposible asegurarle que el fuerte gasto económico que supone para salvarlo no será en vano.

